

図**15.48** 鱗状毛包性角化症(土肥) (keratosis follicularis squamosa (Dohi))




図 15.49 鱗状毛包性角化症(土肥)の病理組織像



図 **15.50** 固定性扁豆状角化症(hyperkeratosis lenticularis perstans)

10. 連圏状粃糠疹(遠山) pityriasis circinata(Toyama)

同義語: pityriasis rotunda

腰部,腹部,殿部に生じる後天性角化症.皮疹は直径1~数cm,正円形あるいは楕円形で境界明瞭な角化性の淡紅色局面である.褐色~灰白色のちりめん皺様の落屑を伴う.内臓悪性腫瘍の合併例がある.

11. 固定性扁豆状角化症 hyperkeratosis lenticularis perstans

同義語:Flegel 病

中高年の四肢、とくに足背や手背に好発。直径 $1\sim5\,\mathrm{mm}$ までの赤~茶褐色調の、鱗屑が固着した棘状の扁平隆起性丘疹で、左右対称性に発症する(図 **15.50**)。原因不明で慢性に経過する.

12. 後天性魚鱗癬 acquired ichthyosis

Essence

- ●悪性腫瘍(悪性リンパ腫など), サルコイドーシス, 薬剤などに続発.
- 尋常性魚鱗癬に類似した臨床像をとるが、関節伸側のみでなく屈側も侵す。