

図 21.27 稗粒腫 (milium)




図 21.28 皮様嚢腫 (dermoid cyst)




図 21.29 外毛根鞘嚢腫 (trichilemmal cyst) の病 理組織像

外毛根鞘性角化を呈し顆粒層を伴わずに角化している.

#### 定義・病因

原発性のものは、胎生期の上皮芽の迷入により角化性嚢腫が 形成されて発症すると考えられる. 続発性のものは. 水疱症(栄 養障害型表皮水疱症、後天性表皮水疱症など)、熱傷瘢痕、放射 線皮膚炎などに引き続いて生じる。付属器や角化細胞がこれら の疾患によって破壊され、表皮下で嚢腫状に増殖して発症する.

#### 治療

注射針やメスで小切開し、白色球状の内容物を排出する.

### 3. 皮様囊腫 dermoid cyst

頭部に好発する直径1~4cmの半球状に降起した皮下結節 (図 21.28a). 出生時から存在する. 類表皮嚢腫と誤診されや すい. 病理組織学的には. 表皮から構成される嚢腫壁に加え. 脂腺や汗腺などが認められる(**図 21.28b**).

### 4. 外毛根鞘囊腫 trichilemmal cyst

同義語:毛髪囊腫 (pilar cyst)

約90%が頭部に生じる。臨床所見は類表皮嚢腫と類似する。 毛包峡部由来と考えられ、病理組織学的には上皮細胞からなる 囊腫壁をもち、顆粒層を形成することなく角化を起こす〔外毛 根鞘性角化 (trichilemmal keratinization)]. 角化細胞の一部 に核の遺残がみられる場合がある(図 21.29)

### 5. 多発性脂腺囊腫 steatocystoma multiplex

多くは3~30mmの大きさで腋窩,前胸部,上肢などに好 発する,正常皮膚色から淡黄色,淡青色調の半球状に隆起した 硬い腫瘍(図21.30). 毛孔一致性に生じる場合がある. 先天 性爪甲肥厚症(19章 p.374参照)で本症を多発性に生じること があり、ケラチン17の遺伝子変異が報告されている、病理組 織学的には、扁平になった皮脂腺が直接または近傍に存在する ことが特徴. 囊腫壁は数層の上皮成分から構成され、複雑に入 り組んでいる様子を認める。

# eruptive vellus hair cyst

毳毛 (vellus hair) は、いわゆる"産毛"のことであり、本 症は毳毛毛包由来の嚢腫である. 胸部に好発する直径数 mm の自覚症状のない毛孔性丘疹. 毛孔性角化や臍窩様の外観を呈することがある. 多発性脂腺囊腫(前項参照)の合併例や囊腫壁に脂腺構造を伴う場合もあるため,両者は関連性があると示唆される.

## 7. 毛巢洞 pilonidal sinus

同義語:毛巣囊腫 (pilonidal cyst), 毛巣瘻, 毛巣病

機械的に毛の先端が皮内に刺さり、その部位で肉芽組織や、毛包とみられる扁平上皮に囲まれた瘻孔を形成する. 感染を繰り返しながら増大傾向を示す. 殿部に多毛傾向のある若い男性の仙骨部に好発. 後頭部や眼瞼、外陰部、腋窩、臍部、指趾間などにも生じうる. 指間に生じるものは、理容師などの職業性に生じるものが多い. 瘢痕組織を含めて十分に切除する(図 21.31).

## 8. 鰓性囊胞 branchial cyst

耳前部から頸部にみられる類表皮嚢腫様の皮下結節. 鰓裂の遺残によって生じるため、嚢腫底部の可動性は悪く、深部に索状物を触知する. 安易な切除はすべきではなく、頭頸部外科へのコンサルトを要する. 甲状舌管の遺残によって生じたものを甲状舌管嚢胞 (thyroglossal duct cyst) ないし正中頸嚢胞 (median cervical cyst) と呼ぶ.

### 9. 中央縫線囊胞 median raphe cyst

若い男性の陰茎縫線に沿って生じる直径数 mm 大の嚢胞 (図 21.32) で、尿道口唇部で単発する例が多い、なかには数 cm になるものもある。陰嚢や会陰に生じることもある。病理組織学的には、尿道の移行上皮に類似した 1 層ないし数層の、円柱上皮ないし立方上皮からなる嚢腫壁をもつ。

# 10. 耳介偽囊腫 pseudocyst of the auricle

耳介上半部の軟骨内に波動を触れる緊満性の囊腫が片側性に 生じる. 発赤, 疼痛などの炎症症状はほとんどない. レスリン グ選手やアトピー性皮膚炎患者など, 耳介に慢性刺激を加える 者に好発する. 耳介の軟骨内に, 上皮成分を伴わない液体貯留 (仮性囊胞) を生じる. 穿刺後圧迫固定やステロイド局注など で治療するが, 難治性である.




図 21.32 中央縫線囊胞 (median raphe cyst)