




図 21.49 静脈奇形 (venous malformation)
左胸部に浸潤を伴う腫瘍を認める。深部の血管にも異常をきたす。



図 21.50 静脈湖 (venous lake)

4. クモ状血管拡張 spider telangiectasia ★

同義語：クモ状血管腫 (vascular spider, spider nevus, spider angioma)

中央に直径数 mm までの赤色丘疹があり，その周囲に放射状に毛細血管の拡張を認め，クモが長い足を広げたような外観を呈する（図 21.51，図 3.32 参照）。顔面，頸部，肩，胸，上肢に好発する。妊娠時や肝機能障害時などにエストロゲン上昇を基礎として出現することがある。健常人でも約 15% で認められる。皮疹は硝子圧法にて消退。色素レーザー療法が有効。妊婦や小児でみられるものは自然消失する。

5. リンパ管奇形 lymphatic malformation ★

同義語：リンパ管腫 (lymphangioma)

Essence

- リンパ管の形成異常により生じた，リンパ管の過形成と拡張による良性の病変。
- 1～2 mm 大の小水疱が集まり，ときに水疱内出血を起こして紅色～黒色丘疹となる。
- 治療は外科的切除。
- 乳癌や子宮癌などの手術後，腋窩もしくは^{そけい}鼠径部などに生じるものはリンパ管拡張症（後天性リンパ管腫）と呼ばれる。




図 21.51 クモ状血管拡張 (spider telangiectasia)
クモの巣のように毛細血管が拡張している。




図21.52① リンパ管奇形 (lymphatic malformation)
限局性リンパ管腫。