



図 21.65 指趾粘液嚢腫／ガングリオン (digital mucous cyst / ganglion)  
a, c: 臨床像. b: 外科的切除. d: 病理組織像.

### 乳児指趾線維腫症 (infantile digital fibromatosis)

MEMO

## 14. 指趾粘液嚢腫／ガングリオン digital mucous cyst / ganglion

指趾末節背面に生じた、ムチンを含んだ偽嚢腫性病変 (図 21.65)。水疱あるいは疣贅のような外観を呈することがある。myxomatous type と ganglion type に大別され、前者は線維芽細胞によるヒアルロン酸の過剰生産が原因で、本質的に限局性のムチン沈着症である。後者は関節嚢あるいは腱鞘のヘルニアである。不十分な切除は再発を招く。穿刺吸引、圧迫療法、凍結療法、ステロイド局所注射なども行われる。

## 15. 口腔粘膜粘液嚢腫 mucous cyst of the oral mucosa

下口唇(まれに頬粘膜、舌)に現れる、ドーム状隆起を示す直径2～10 mmの軟性腫瘤(図 21.66)。切開により黄色調で透明な粘液を排出する。咬傷により唾液腺の排出管が破れ、唾液が周囲組織に漏出し、肉芽腫を生じたものと考えられる。

図 21.66 口腔粘膜粘液嚢腫 (mucous cyst of the oral mucosa)

## I. 組織球系腫瘍 histiocytic tumors

### 1. 黄色肉芽腫 xanthogranuloma

同義語：若年性黄色肉芽腫 (juvenile xanthogranuloma)

黄色～暗赤色調で表面平滑な数 mm～1 cm 大の丘疹および結節で(図 21.67)、顔面部や四肢、体幹に好発する。多くは